

О.П. Адамович

Етіологічна структура сальмонельозу кінця XX – початку XXI століття у Львівській області

Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького, м. Львів

Актуальність. Гострі кишкові інфекції (ГКІ) надалі залишаються актуальною проблемою інфектології. Все частіше серед населення виникають великі спалахи, спричинені сальмонелами, зумовлені грубими порушеннями санітарних норм і правил.

Мета роботи – встановити етіологічну структуру сальмонельозу на зламі XX–XXI сторіч у Львівській області.

Матеріали і методи. Архівні дані 40 карт стаціонарних хворих (КСХ) за 2017 р. та аналогічна кількість за 1992 р. пацієнтів Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, аналіз наявних даних у вітчизняній літературі за темою дослідження.

Результати та обговорення. Встановлено, що у 2017 р. в 1 хворого (2,5%) було виділено *S. typhimurium*, у решта 39 (97,5%) – *S. enteritidis*.

У 1992 р. виділяли таких збудників: *S. enteritidis* у 18 (45%) хворих, *S. typhimurium* в 11 (27,5%), *S. derby* у 5 (12,5%), *S. newport* у 3 (7,5%) та *S. virchow* у 3 (7,5%) осіб.

Проведений епідеміологічний аналіз засвідчив, що в 1992 р. всі випадки захворювання на сальмонельоз були спорадичними, а у 2017 р. поодинокі випадки фіксувались лише у 6 хворих, усі решта – були груповими.

Клінічна симптоматика в усіх випадках була подібною: загальна слабкість, підвищена температура тіла, нудота, блювання, діарея.

Висновки: У XXI сторіччі у Львівській області спостерігається зміна етіологічної структури сальмонельозу. Найчастіше реєструються випадки, спричинені *S. enteritidis*.